

Tab. A.2:

Zuordnung von Prozentrangwerten, T-Normen und Staninewerten nach der Transformation von McCall zu den mittleren Prozentwerten über die sechs Leistungsbereiche (Darstellung nach Lienert & Raatz, 1994, Tafel 2, S. 410) für N = 120 Aphasiepatienten zwischen Tag 2 und 7 nach einem ersten Schlaganfall

T-Wert	Mittlerer Prozentwert über die sechs Leistungsbereiche	Prozentrang	Stanine Wert	T-Wert	Mittlerer Prozentwert über die sechs Leistungsbereiche	Prozentrang	Stanine Wert
< 24		0		50,5	65,28	52	5
24	0	0		51	66,67	54	5
25		1		51,5	68,98	56	5
26		1		52	69,68	58	5
27	0,69	1		52,5	69,91	59	5
28		1		53	71,3	62	6
29		2	1	54	73,84	66	6
30	1,39	2		54,5	74,31	68	6
31	1,85	3		55	74,54	69	6
32	2,08	3		56	76,85	73	6
33	5,56	4	1	57	77,31	76	6
34	6,25	5	2	58	78,01	79	7
35	9,72	7		59	78,70	82	7
36	10,19	8	2	60	79,17	84	7
37	11,11	10	2	61	81,48	86	7
37,5	11,72	11	2	62	82,41	88	7
38	12,5	12		63	83,33	90	8
38,5	15,97	12,5	3	64	84,72	92	
39	16,67	13	3	64,5	85,65	92,5	8
40	19,44	16	3	65	86,11	93	
41	21,99	18	3	66	UG (1%): 88,8	95	8
42	28,24	21	3	67	89,58	96	8
42,5	29,22	22	3	68	UG (5%): 90,8	96	
43	34,26	24	4	69		97	
43,5	43,75	25	4	70		98	9
44	45,83	27	4	71		98	
44,5	47,45	29	4	72		99	
45	49,31	31	4	73		99	
45,5	51,39	33	4	74		99	9
46	51,62	34	4	75		100	
47	56,25	38	4	76		100	
47,5	57,64	40	4	77		100	
48	59,95	42	5	≥ 78		100	
48,5	60,84	44	5				
49	61,11	46	5				
49,5	63,19	48	5				
50	64,81	50	5				